

عوامل مستعد کننده:

ابتلا به یک بیماری که مقاومت بدن را کم

کرده باشد

اعمال جراحی روی مفصل

مفصل مصنوعی

تزریق داخل مفصل

بهداشت پایین

دیابت



## پیشگیری:

محافظت از مفصل هنگام فعالیت شدید

درمان عفونت نقاط مختلف بدن

## عوارض ابتلا به عفونت سپتیک:

تاخیر در درمان ممکن است باعث آسیب به

مفصل یا عفونت خون گردد



## آرتريت سپتیک :

به معنی التهاب مفصل ناشی از عفونت است در این بیماری هر مفصلی می تواند مبتلا شود املا مفاصل بزرگتر مثل ران و مفاصلی که بیشتر در معرض ضربه هستند مثل زانو یا دست بیشتر در معرض ابتلا هستند.

## علائم بیماری:

تب - تورم و قرمزی - درد هنگام لمس مفصل که به مفاصل دیگر انتشار می یابد . همچنین کودک ممکن است از حرکت دادن مفصل خودداری کند و آن را در وضعیت ثابت نگه دارد

## علت ابتلا:

وارد شدن میکروب به مفصل از طریق زخم در آن محل یا وارد شدن جسم نوک تیز آلوده به مفصل یا انتشار عفونت از طریق خون از یک کانون عفونی در بدن



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  
بهداشتی درمانی قم

مرکز آموزشی - درمانی حضرت  
فاطمه معصومه (س)

## آرتریت سپتیک


تهیه کننده: مریم حبیب الهی

بخش عفونی ۲

با همکاری واحد آموزش دفتر پرستاری

بیمارستان حضرت معصومه (س) -

تابستان ۹۵



چند توصیه مهم به والدین:

- ✓ کاهش درد بیمار با مسکن
  - ✓ مصرف به موقع آنتی بیوتیک
  - ✓ مراقبت از آتل یا گچ
  - ✓ انجام حرکات تمرینی در زمان صلاحدید
  - ✓ پزشک برای بازگرداندن حرکت مفصل
  - ✓ رژیم سرشار از پروتئین و ویتامین و مایعات
  - ✓ جهت ویزیت توسط دکتر موحدی با در دست داشتن خلاصه پرونده شنبه ها ساعت ۱۱-۱۳ به درمانگاه این مرکز و سه شنبه ها ساعت ۱۵-۱۳ به درمانگاه دارالشفای مراجعه نمایید
- منبع: کتاب پرستاری کودکان و ننگ-سونیا ✓

آرزومانیانس - ۱۳۹۰



درمان آرتریت سپتیک:

مصرف آنتی بیوتیک

مصرف مسکن جهت کاهش درد

استراحت از آتل یا گچ برای استراحت مفصل

جراحی برای تخلیه مایع عفونی شده یا خارج

کردن جسم خارجی وارد شده به مفصل گاهی

ضروری است

