

ختنه

ختنه برداشتن قسمتی از پوست اضافی سرالت می باشد طوری که از تجمع ترشحات زیر پوست جلوگیری شده وقابل تمیز کردن باشد.

ختنه یک عامل بازدارنده از سرطان الت تناسلی و ایدز می باشد.در بیماری های اختلالات خونریزی دهنده مثل هموفیلی ختنه انجام نمی شود

مراقبت های بعد از عمل ختنه

- خونریزی خفیف را میتوان با فشار ملایم گاز تمیز به مدت پنج الی ده دقیقه بند آورد.
- گاز پانسمان ۲۴ ساعت پس از ختنه برداشته می شود و پیش از برداشتن

پانسمان بهتر است ک پانسمان را با آب و لرم مرطوب کنید تا به راحتی از روی زخم برداشته شود.

- بعد از برداشتن پانسمان مقداری وازلین بهداشتی به همراه پماد تترا سایکلین حداقل سه بار در روز به مدت یک هفته روی محل ختنه قرار دهید.
- بهبودی آلت معمولا ۷الی ۱۰ روز طول میکشد ولی در سنین بالاتر بهبودی دیرتر حاصل می شود.
- در ابتدا نوک الت متورم و قرمز خواهد بود و ممکن است مقداری قرمزی خون در پوشک کودک مشاهده کنید.
- چند روز اول ترشح زرد رنگ روی آلت مشاهده میشود که طبیعی است و خود بخود از بین می رود.

- پوشک نوزاد حتی المقدور بسته نشود یا از پوشک یک سایز بزرگتر استفاده شود.
- هر روز محل ختنه را به آرامی با آب خالی شست شو داده و با پارچه تمیز خشک کنید و از دستمال مرطوب استفاده نکنید.
- در صورت آغشته شدن محل ختنه با مدفوع آن را با آب ولرم شستشو داده سپس خشک نمایید. با توجه به استریل بودن ادرار نیاز به شستشوی مکرر نیست.
- شستشوی محل ختنه با بتادین توصیه نمی شود.
- برای تسکین درد میتوان از قطره یا شربت استامینوفن بر



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

قم

مرکز آموزشی - درمانی حضرت فاطمه

معصومه (س)

ختنه

بخش جراحی بهار ۹۵

- افزایش قرمزی و عدم برطرف شدن آن بین ۳-۵ روز پس از ختنه
- تغییر رنگ و تیرگی نوک آلت، خونمردگی وسیع در آلت و بیضه نوزاد
- ناتوانی در ادرار کردن در ۶-۸ ساعت اول پس از ختنه
- ترشح و تورم و تاول چرکی
- کل آلت قرمز و متورم می‌باشد.

جهت مراجعه سرپایی بعد از ترخیص:

**دکتر امراله سلیمی فوق تخصص
جراحی کودکان**

میدان امام بعد از کوچه ۲۲ درمانگاه دارالشفاء. دوشنبه و چهارشنبه ۵ تا ۷ عصر.

درمانگاه تخصصی بیمارستان حضرت معصومه سه شنبه ۸ تا ۱۰ صبح.

اساس تجویز پزشک استفاده کرد.

- اگر سن کودک هنگام ختنه بیشتر از دو سال است اجازه دویدن یا بازی کردن زیاد به او ندهید، چون ممکن است باعث خونریزی محل زخم شود.
- حمام کردن کودک از روز سوم بلامانع است. حمام ترجیحا کوتاه مدت باشد و بهتر است بلافاصله خشک گردد.
- بخیه های محل زخم از نوع جذبی است و نیازی به برداشته شدن ندارد.

در صورت مشاهده شدن موارد زیر

حتما به پزشک مراجعه کنید: