

آسپرین خونریزی زیر پوستی نیز می دهد و ممکن است با یک ضربه آرام نیز دچار خونمردگی های پوستی شود بنابراین کودکان از فعالیت هایی که خطر آسیب بدنی دارد منع گردد.

دقت کنید تا زمانی که کودک آسپرین مصرف می کند با افراد مبتلا به آبله مرغان و آنفلاززا در ارتباط نباشد و در صورت ابتلا به آبله مرغان و آنفلاززا آسپرین قطع گردد



اگر درمان در مدت ۱۰ روز شروع بیماری انجام شود کودک خیلی زود خوب شده و عوارض بدی به جا نمی گذارد. پزشک برای درمان از گاماگلوبولین های تزریقی به نام آی وی آی جی استفاده می کند ممکن است به کودک آسپرین هم داده شود.

تشخیص

برای تشخیص بیماری آزمایش اختصاصی وجود ندارد و پزشک بر اساس علائم بیماری آن را تشخیص می دهد. ابتدای بیماری کودک به شدت بی حال است و بدنش قرمز است این شرایط ممکن است شما را نگران کند ولی اگر درمان زود شروع شود کودک کاملا بهبود یافته و احتمال عود آن کم است

ممکن است بنا به صلاحدید پزشک کودک مدتی آسپرین مصرف کند و با توجه به این که آسپرین ممکن است خونریزی گوارشی دهد در صورت درد معده و خون در مدفوع حتما به پزشک مراجعه نمایید.

بیماری کاوازاکی چیست؟

در این بیماری عروق خونی تمام بدن ملتهب می شود و این التهاب علائمی ایجاد می کند. علت این بیماری هنوز شناخته نشده است ولی بعضی دانشمندان اعتقاد دارند ابتلای کودک به عفونت می تواند این بیماری را ایجاد کند. اگر بیماری زود تشخیص داده شده و درمان شروع شود کودک طی چند روز تا چند هفته بهبود می یابد.

علائم

در این بیماری علائم مرحله به مرحله ظاهر می شود اولین علامت تب بالای ۳۹ درجه است که بیش از ۵ روز طول کشیده است. چشم های کودک به شدت قرمز و بدون ترشح است. لبها نیز قرمز و خشک و ترک خورده می شود زبان کودک ورم کرده و اگر به سطح زبانش نگاه کنید قرمز است. دهان زخم و تحریک پذیر می شود حتی کف دست و پاهای کودک نیز قرمز مایل به صورتی و ورم کرده می شود غدد لنفاوی کودک ورم می کند دو هفته بعد از شروع تب پوست انگشتان دست و پا شروع به پوسته پوسته شدن می کند. ممکن است کودک تورم مفاصل را داشته باشد. اسهال و استفراغ و ریزش مو نیز ممکن است اتفاق افتد در صورت بروز این علائم در کودکان به پزشک مراجعه نمایید.





دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی قم

مرکز آموزشی - درمانی حضرت
فاطمه معصومه (س)

کاوازاکی

تهیه کننده: فاطمه زرنگ

بخش عفونی ۲

با همکاری واحد آموزش دفتر پرستاری

بیمارستان حضرت معصومه (س) -

تابستان ۹۵



اگرچه التهاب عروق قلب کمتر اتفاق می افتد اما ممکن
است پزشک اکوکاردیوگرافی قلب را چندین بار طی
درمان با فاصله زمانی مشخص را توصیه کند این کار
برای اطمینان از عدم التهاب عروق قلب می باشد

والدین گرامی: جهت ویزیت توسط دکتر

موحدی با در دست داشتن خلاصه پرونده شنبه ها

ساعت ۱۱-۱۳ به درمانگاه این مرکز و سه شنبه ها

ساعت ۱۳-۱۵ به درمانگاه دارالشفای مراجعه نمایید

منبع: کتاب پرستاری کودکان و ننگ-سونیا ✓

آرزومانیاس - ۱۳۹۰



یک تا دو هفته بعد از شروع بیماری ممکن است کودک

در ناحیه دست و پا پوسته ریزی داشته باشد. اگرچه

دردناک نیست ولی پوست جدیدی که تشکیل بسیار

حساس است پوست کودک به مدت چند هفته بسیار

خشک است و باید مرطوب کننده استفاده کند تا پوست

خشک نشود و ترک نخورد.

در هفته اول و دوم بیماری لازم است هر روز دمای بدن

کودک اندازه گیری شود در صورت بروز تب مجدد به

پزشک مراجعه شود ممکن است کودک مجدد نیاز به آی

وی آی جی پیدا کند.

کودک ممکن است بعد از ترخیص نیز خسته و تحریک

پذیر باشد. به خاطر داشته باشید این علائم برطرف خواهد

شد و به زودی کودک فعال و پر انرژی خواهد شد.

